	Parasites			Contrôle Parasite			
Noms	**Symptômes rameaux**	**Symptômes feuilles**	**Symptôme grappes**	**Atténuation**	**Génétique**	**Lutte Indirecte**	**Lutte Directe**
Date stade							
Seuil de sensibilité	Code couleur						
Excoriose				**Contrôle de la vigueur apport azoté, Ne pas travailler lorsque forte humidité**	**Cépage sensible Cabernet sauvignon**		**Si présence 10 à 20 % Soufre**
Seuil de sensibilité							
	Description et photo	Description et photo	Description et photo				
Seuil de sensibilité							
Seuil de sensibilité							

																																
	Stade 02 ou stade A Bourgeon d'hiver		Stade 03 ou stade B bourgeon dans le coton		Stade 05 ou stade C pointe verte		Stade 06 ou stade D Sortie de feuille		Stade 09 ou Stade E Feuilles étalées		Stade 12 ou Stade F grappe visible		Stade 15 ou Stade G Grappes séparées		Stade 17 ou Stade H boutaux floraux séparés		Stade 23 ou stade I Floraison		Stade 27 ou Stade J nouaison		Stade 31 ou stade K petit pois		Stade 33 ou Stade L fermeture de la grappe		Stade 36 ou Stade M véraison		Stade 38 ou Stade N Maturité		Stade 43 ou Stade O Chute des feuilles	
Date stade	30/03/2021		03/04/2021		20/04/2021		04/05/2021		11/05/2021		18/05/2021		26/05/2021		01/06/2021		15/06/2021		29/06/2021		13/07/2021		27/07/2021							
Seuil de sensibilité																																

Si symptôme, ou sur cépage sensibles et si temps est pluvieux au cours des stades D et E:

Stratégie en bio 2 30% des bourgeons au stade D puis 40% au stade E.

Stratégie en conventionnelle Soit 2 application 30% des bourgeons au stade D au stade E.
Soit une application au stade D